

Mildiou de l'Impatiens

Le Mildiou de l'impatiens (*Plasmiodora obdecens* en latin ou Downy mildew en anglais) est une maladie qui a pris de plus en plus d'ampleur depuis quelques années dû aux printemps pluvieux. Se développant à la fois sur les plants produits par semences et par boutures en serres, la maladie cause d'abord le jaunissement des feuilles, la courbure du bord des feuilles vers le bas et l'apparition de moisissure blanchâtre sur le dessous du feuillage.



Ensuite, le feuillage et les fleurs flétrissent prématurément et tombent. Les oospores qui sont responsables de la survie de ce champignon pathogène peuvent survivre pendant des années dans le sol, il est donc important de ne pas replanter d'impatiens aux endroits infestés pendant une période d'environ 5 à 10 ans. Tous les cultivars d'impatiens walleriana et balsamina à fleurs simples ou doubles sont affectés.



Voici donc quelques suggestions de plantes pouvant remplacer l'impatiens walleriana dans vos plates-bandes ombragées jusqu'à ce qu'un cultivar résistant à cette maladie soit développé :

Viola



Begonia semperflorens



Coleus



Impatiens de Nouvelle-Guinée



Profitez de l'été 2014 pour découvrir de nouvelles variétés de fleurs annuelles qui sauront vous séduire autant que l'impatiens walleriana !